

## СОГЛАСОВАНО

Председатель ППО *И.Н.Ильина*

*И.Н.Ильина* Н.Н.Ильина

Протокол *25*

« *23* » *июня* 2020 год

## УТВЕРЖДАЮ

Директор  
СПб ГБПОУ «АК»

*Д.Ю.Батраков* Д.Ю.Батраков

« *25* » *июня* 2020 год

## ИНСТРУКЦИЯ

### по применению дезинфицирующего средства - кожного антисептика (альфасептик)

#### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. В общем понимании антисептик – это средство, используемое для блокировки процессов размножения и передачи возбудителей различных инфекций, либо патогенных микроорганизмов на поверхности кожных покровов.

1.2. Во избежание осложнений при использовании специальных обеззараживающих средств необходимо соблюдать определённые правила, следуя которым можно избежать обезвоживания кожи, аллергического дерматита или иных последствий нарушения микрофлоры кожного покрова.

#### 2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Гигиеническая обработка рук: дозу антисептика выдавить на руки и растереть ладонями по всей поверхности кожи рук, дать высохнуть.

2.2. Обработка небольших поверхностей: поверхность тщательно протирают тканью, обильно смоченной средством до влажного состояния. Экспозиция - до полного высыхания обрабатываемой поверхности.

#### 3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1. Средство используют только для наружного применения.

3.2. Не наносить на раны, избегать попадания средства в глаза.

3.3. По истечении указанного срока годности использование запрещается.

3.4. Легко воспламенется. Не допускать контакта с открытым огнем и нагревательными приборами. Хранить при температуре от -5°C до +30°C.

#### 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

4.1. При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего вывести на свежий воздух или в другое помещение. Рот и носоглотку прополоскать водой. При необходимости обратиться к врачу.

4.2. При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды с 10-20 измельченными таблетками активированного угля; желудок не промывать! Обратиться к врачу.

4.3. При попадании средства в глаза необходимо обильно промыть глаза под струёй воды в течение 10-15 минут. Обратиться к врачу.